

# Manni-Plex® TITAN

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

## Λίπασμα ιχνοστοιχείων ταχείας απορρόφησης

Σύνθεση (% β/β):

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Άζωτο (N) ολικό              | 5.00 |
| Ουρικό άζωτο                 | 2.30 |
| Νιτρικό άζωτο                | 2.70 |
| Βόριο (B)                    | 0.25 |
| Σίδηρος (Fe)                 | 1.00 |
| Μαγγάνιο (Mn)                | 2.50 |
| Από το οποίο υδατοδιαλυτό Mn | 2.50 |
| Ψευδάργυρος (Zn)             | 2.00 |

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

### ΣΤΟΧΟΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΗΜΑΤΑ:

Το Manni-Plex Titan βασίζεται σε μία μοναδική τεχνολογία που καθιστά τα θρεπτικά συστατικά του άμεσα διαθέσιμα στα φυτά. Πρόκειται για ένα μίγμα σακχάρων και αλκοολών με μικρό μοριακό βάρος που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση και μετακίνηση των θρεπτικών συστατικών μέσω του ξυλώδους και φλοιώδους παρεγχύματος των φυτών στις ζώνες ανάπτυξης και τους καρπούς.

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία των θρεπτικών μαγνησίου και των συμπλημάτων που προκαλούν, βελτιώνουν την παραγωγή και την ποιότητα της καλλιέργειας.

# BRANDT

### Παρασκευαστής:

Brandt Consolidated, Inc., 2935 South Koke Mill Road, Springfield, Illinois 62711 USA

Υπεύθυνος επικοινωνίας, διανομέας για την Ελλάδα:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23, Τηλ.: 210 68.00.900-9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, Ο.Τ.53B, ΒΙ.Π.Ε.Θ, 57022 Σίνδος, Τηλ.: 2310 79.79.07

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ.Ιωάννης 353 00, Τηλ.: 22380 22.008-9

e-mail: info@hellafarm.gr

Καθαρό Περιεχόμενο: 1000 λίτρο

Αριθμός παρτίδας:

### ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο νερού για πλήρη κάλυψη.

Η επιλογή της κατάλληλης δόσης, από το προτεινόμενο εύρος, εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Συνιστώνται τουλάχιστον δύο εφαρμογές. Για περιπτώσεις σοβαρών θρεπτικών μπορεί να χρειαστούν περισσότερες εφαρμογές, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν με τη μικρότερη προτεινόμενη δόση.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

| Καλλιέργεια  | Δοσολογία κ.εκ./100 λίτρα νερού | Χρόνος εφαρμογής  |
|--|---------------------------------|---|
| Ελιά   | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και μετά την καρπόδεση  |
| Αμπέλι<br>(επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο)   | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και μετά την καρπόδεση, στην ωρίμανση   |
| Εσπεριδοειδή<br>(πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά κ.ά)<br>Μηλοειδή<br>(Μηλιά, αχλαδιά)<br>Πυρηνόκαρπα<br>(Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά, κερασιά)<br>Ακτινιδιά | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και μετά την καρπόδεση ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας                                  |
| Φράουλα  | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και επανάληψη ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας   |
| Φουντουκιά   | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και στην καρπόδεση  |
| Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι, αγγούρι  | 250 - 500                       | Πριν την άνθηση και μετά την καρπόδεση  |
| Καρότο, σέλινο   | 250 - 500                       | Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 20 μέρες   |
| Μαρούλι  | 250 - 500                       | Στο στάδιο των 4-6 φύλλων και μετά από 15 μέρες (διαδοχικές εφαρμογές ανάλογα με το μέκος του κύκλου ανάπτυξης) |
| Κηπευτικά υπό κάλυψη   | 250 - 500                       | Βλπ τα στάδια ανάπτυξης της αντίστοιχης καλλιέργειας υπαίθρου μειώνοντας κατάλληλα τη δόση                      |

| Καλλιέργεια        | Δοσολογία κ.εκ./100 λίτρα νερού | Χρόνος εφαρμογής   |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Αραβόσιτος, τεύτλα | 250 - 500                       | Στο στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων και μετά από 15-20 μέρες               |
| Ηλιανθος           | 250 - 500                       | Από το στάδιο των 6 ως το στάδιο των 10 φύλλων                               |
| Πατάτα             | 250 - 500                       | Στην πρώτη φάση βλαστικής ανάπτυξης και στην έναρξη του σχηματισμού κονδύλων |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο κατά το 1/3 έως 2/3 με καθαρό νερό. Προσθέστε τυχόν προσκολλητικά προϊόντα και αναδεύετε για αρκετά λεπτά. Προσθέστε τυχόν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχίστε την ανάδευση για αρκετά λεπτά.

Στο τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα Manni-Plex Titan υπό συνεχή ανάδευση μέχρι την πλήρη ανάμιξη. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό και συνεχίστε την ανάδευση μέχρι την εφαρμογή.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από τα σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, τα ορμικέλαια και τα υπερφωσφορικά λιπάσματα..

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σε θερμοκρασίες από 4 ως 35°C.

### Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία:

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά τη χρήση.

Μην εισπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια.

**Πρώτες βοήθειες:**

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστεί δύσπνοια, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777